DOLOR POR CÁNCER , TITULACIÓN DE TRATAMIENTO CON OPIOIDES FUERTES

Paciente con dolor no controlado en tratamiento

↓

Evaluación II

↓

Considerar progresión de la enfermedad.

✓Descartar otras causas de dolor no controlado (Ej: infección, fractura, constipación, retención urinaria, etc.)
✓Evaluar tratamiento sobre el mecanismo del dolor.
✓El dolor neuropático o mixto suele ser pobre respondedor a opioides.
✓Detectar causas no nociceptivas de aumento de expresión del dolor o el reporte familiar (falla cognitiva, somatización, adicción, claudicación familiar)
✓Analizar opioides previamente recibidos y sus efectos.

→

Considerar progresión de la enfermedad.

✓Descartar otras causas de dolor no controlado (Ej: infección, fractura, constipación, retención urinaria, etc.)
✓Evaluar tratamiento sobre el mecanismo del dolor.
✓El dolor neuropático o mixto suele ser pobre respondedor a opioides.
✓Detectar causas no nociceptivas de aumento de expresión del dolor o el reporte familiar (falla cognitiva, somatización, adicción, claudicación familiar)
✓Analizar opioides previamente recibidos y sus efectos.

↓

Intervención psicosocial

Considerar Adyuvantes específicos