

Abordaje

Alacranismo

Clasificación	Clínica	Tratamiento General	Tratamiento Específico
LEVE	Síndrome local - Dolor - Lesión en sitio de la picadura (Puede haber manifestaciones generales transitorias, relacionadas con el dolor agudo: taquicardia, aumento presión arterial, sudoración, etc.)	 Limpieza de la herida Aplicación de frío en el sitio de la picadura Analgésicos no esteroideos (paracetamol o ibuprofeno) Anestésicos locales Observación por 4-6 horas 	No se administra suero antiveneno.
MODERADO	Síndrome local acompañado de: - Sudoración - Náuseas y vómitos ocasionales. Sin compromiso hemodinámico y respiratorio de importancia.	Manejo de los casos LEVES sumado a: -Ingreso a Cuidados Intermedios o UTIAntieméticos -Dosis bajas de benzodiacepinas - Correcciones de valores alterados de laboratorio Tto. de complicaciones (cardíacas, respiratorias)	Administración EV rápida de Suero Antiveneno escorpiónico (Tityus trivittatus) 150DL *
GRAVE	Síndrome local acompañado de: - Vómitos incoercibles - Marcado aumento de secreciones - Arritmias - Hipotermia - Shock cardiogénico - Insuficiencia respiratoria - Espasmos musculares - Convulsiones - Coma	Ingreso a Terapia Intensiva de alta Complejidad - Tto. específico de complicaciones Ventilación Mecánica - Soporte con drogas inotrópicas (Dobutamina) -Sedoanalgesia con opiáceos y benzodiazepinas, y otros	Administración EV rápida de Suero Antiveneno escorpiónico (Tityus trivittatus) 300DL *

^{*} La capacidad neutralizante de cada frasco ampolla (expresada en la cantidad de DL50 que neutraliza) es levemente variable en cada lote.



Programa Pcial de Control de Zoonosis y Vectores Dirección De Epidemiología

