

## Recomendaciones para el personal involucrado en la emergencia hídrica

En el **trabajo en territorio con la comunidad afectada** se debe priorizar a las personas por riesgo de exposición y evaluar medidas de prevención para enfermedades transmitidas por agua no segura y contacto con residuos orgánicos y basura.

### Grupo 1: Personas priorizadas

Personal municipal y contratado para la ocasión (ONGs, voluntarios, etc) que realiza trabajos de limpieza en terreno / personal de salud / otro personal afectado en operativos y brigadas.

- Personas evacuadas.
- Personas que no fueron evacuadas, pero que permanecerán con agua dentro de sus hogares.

*Personas de riesgo (embarazadas, pacientes crónicos, ancianos, cuadros agudos, etc).*

### Recordar.

#### Enfermedades por tiempo de aparición

<b>ANTES DE 1 SEMANA</b>	<b>ENTRE 1 Y 3 SEMANAS</b>
<b>-Primeros 2 días:</b> <b>Enfermedad diarreica aguda</b>	<b>Diarreas agudas porparásitos:</b>  <i>Giardiasis-Amebiasis</i>
<b>- 3 días en adelante: Cuadros respiratorios agudos</b>	<b>Enfermedades transmitidas por mosquitos:</b> <i>Dengue-Chikungunya-Zika</i>
<b>Conjuntivitis Dermatitis aguda</b>	<b>Leptospirosis</b>

### Acciones

- *Relevar situaciones de salud.*
- *Garantizar insumos para enfermedades frecuentes: paracetamol, antibióticos, salbutamol, corticoides, sales de hidratación, suero antiofídico y antialacrán, etc.*
- *Vacuna doble adultos, vacuna de hepatitis A (registrar en SICAP).*
- *Quimioprofilaxis para leptospirosis con doxiciclina (nominalizar y registrar en SICAP).*
- *Recomendaciones para uso de agua segura: pastillas potabilizadoras, elementos de protección e insumos para limpieza.*
- *Evaluar tipo de moviidades: camionetas-lanchas-gomones, etc.*
- *Trabajo articulado con otras dependencias.*
- *Evaluar situación de animales muertos, alacranes y ofidios.*



### **Grupo2**

#### **Si se mantiene el anegamiento durante una semana ó más**

*Personas no evacuadas, sin agua en el domicilio, pero con gran cantidad de agua acumulada en el trayecto de ingreso y salida del hogar por más de 48 horas.*

- *Mantener recomendaciones de cuidado e higiene personal.*
- *Instar a la consulta precoz ante síntomas.*