



**En el caso de haber recibido tratamiento con plasma de convaleciente COVID-19, ¿puedo recibir la vacuna contra COVID-19?**

Por el momento la recomendación es que la vacunación se posponga durante 90 días desde el tratamiento para evitar su interferencia en la respuesta inmune inducida por la vacuna.

**Si estoy gestando o dando de amamantar, ¿puedo vacunarme contra COVID-19?**

La vacunación no se recomienda a personas gestantes o que estén amamantando. Esto se debe a que a la fecha no hay estudios de eficacia y seguridad relacionados a la administración de la vacuna contra COVID-19 en este grupo de personas.

**AVISO:** Si sos parte de la población objetivo, es recomendable que realices una consulta con un profesional de salud para hacer una evaluación riesgo/beneficio de la vacunación.

**En el caso de estar recibiendo una medicación que baja mis defensas, o si tengo una enfermedad oncohematológica, inmunosupresión primaria o adquirida, o estoy trasplantado, ¿puedo vacunarme contra COVID-19?**

En estos casos no se recomienda la vacunación ya que a la fecha no hay estudios de eficacia y seguridad relacionados a la administración de la vacuna a personas inmunocomprometidas.

**AVISO:** Si sos parte de la población objetivo, es recomendable que realices una consulta con un profesional de salud para hacer una evaluación riesgo/beneficio de la vacunación.



**Si tengo antecedentes de alergias a cualquier componente de una vacuna o a alguna vacuna con componentes similares, puedo recibir la vacuna contra COVID-19?**

No se recomienda la vacunación COVID-19 a personas con antecedentes de alergias a algunos de los componentes de las vacunas o a vacunas similares.

**Si tengo antecedentes de reacciones alérgicas graves, ¿puedo vacunarme contra COVID-19?**

No. Algunas alergias vinculadas a alimentos, medicamentos y a picaduras de insectos, pueden desencadenar una reacción grave conocida como anafilaxia. La anafilaxia, es una emergencia médica que pone en riesgo la vida que requiere atención médica urgente y medicamentos como adrenalina para su resolución. En el caso de haber presentado alguna reacción alérgica que cumpla con los criterios de anafilaxia, no podrás recibir la vacuna contra la COVID-19 hasta que se obtengan más datos de seguridad en este grupo de personas. Esta recomendación puede modificarse.

**¿Puedo enfermarme de COVID-19 luego de recibir la vacuna?**

La mayoría de vacunas han demostrado más de un 90% de eficacia, esto quiere decir que puede prevenir de contraer la enfermedad y/o de padecer una forma grave. La mayoría de las vacunas no contiene las partes del virus que pueden generar la enfermedad. Sólo ayudan al organismo a generar anticuerpos para combatir la COVID-19.

**Estoy planificando un embarazo. ¿Me puedo vacunar?**

Deberías esperar un mes confirmando que no estás embarazada para poder vacunarte.



### **¿Puedo tomar sol luego de vacunarme?**

Es conveniente, estar las primeras 48 hs después de la vacunación en ambientes frescos, ventilados y aireados, evitando síntomas que puedan confundirse con efectos adversos.

### **¿La vacuna produce la enfermedad?**

La vacuna está creada en base a otro virus, y este no es capaz de provocar la enfermedad.

### **¿Cuándo salgo del vacunatorio ya estoy protegido?**

No, la vacuna te empieza a proteger luego de un período de latencia de 40 días completado el esquema de dos dosis. Por ende, hay que continuar con las medidas de aislamiento y protección personal.

### **Si soy alérgico a la penicilina y al huevo, ¿me puedo vacunar?**

La vacuna solo se encuentra contraindicada en situaciones de alergias a los componentes de la vacuna.

### **Si convivo con alguien que tiene una patología crónica, ¿me puedo vacunar?**

Si, se puede vacunar y además conviene que estés protegido contra la enfermedad para no transmitirla.

### **¿Puedo tomar alcohol luego de vacunarme?**

Si, pero el exceso de alcohol trae consecuencias que podrían confundirse con efectos indeseables de la vacuna.



**Si estoy resfriado y con fiebre, ¿me puedo vacunar?**

Dado el estado de la pandemia, conviene esperar 72 hs, evaluar los síntomas para así poder descartar posible enfermedad COVID-19.

**Si estoy tomando antibióticos, ¿me puedo vacunar?**

Si, si está en tratamiento con antibióticos por patologías infecciosas ya diagnosticadas, se puede vacunar.

**¿Me puedo vacunar si estoy en contacto con un caso positivo de COVID-19?**

Deberá completar el aislamiento de 10 días y si está asintomático se podrá vacunar.